

# Repertorium novarum specierum regni vegetabilis

auctore

F. Fedde

---

---

No. 107/112

VI. Band

20. November 1908

---

---

## X. A. Fomin, Plantae novae Caucasi.

(Aus: Mon. Jard. Bot. Tiflis, Livr. 1 [1905], pp. 5—19.)

### 1. *Chesneya elegans* Fom., l. c., p. 6.

Cinerea adpresse-tomentella caulibus e radice sublignoso repente procumbenti-ascendentibus elongatis (ad 20 cm altis), foliis 5—6-jugis petiolatis, foliolis mediocribus vel majusculis ( $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  cm longis;  $1\frac{1}{4}$ —2 cm latis) subquadrato-oblongis apice truncatis vel retuso-mucronulatis, stipulis obovatis 2—4-dentatis, pedunculis 1—2-floris folio duplo brevioribus, calycis tomentelli dente inferiore lateralibus duplo brevioribus, corolla flavido-violascente calyce subduplo longiore, leguminibus maturis 5—6 cm longis, 7 mm latis valde acuminatis tenuiter tomentellis, seminibus reniformibus dorso alveolatis. Perennis.

Habitat in argillosis et lapidosis Armeniae rossicae prope urbem Olty et prope pagum Kossor, ubi a cl. E. Königo anno 1903 detecta.

### 2. *Campanula Beauverdiana* Fom., l. c., p. 12, c. tab.

Glabra vel minute hirta, rhizomate tenui repente caudiculos subterraneos edente, caulibus gracilibus erectis vel ascendentibus unifloris vel 2—3-floris, foliis membranaceo-marginatis, inferioribus late ovatis vel oblongo-ovatis in petiolum tenuem attenuatis margine obtuse crenatis, caulinis sessilibus lanceolatis vel saepius lineari-lanceolatis acutis margine remote denticulatis, denticulis glanduligeris, summis linearibus acuminatis, basi subtus tuberculo spongioso adnatis, floribus longiuscule pedunculatis, calycis laciniis anguste lanceolatis acuminatis tubo obconico cellulis inflatis spongiosis albis obsito  $1\frac{1}{2}$ -plo vel subduplo longioribus, corolla azurea glabra campanulata ad tertiam partem fissa laciniis calycinis duplo vel  $2\frac{1}{2}$ -plo longiore, stylo caeruleo ad medium fisso incluso. Perennis.

Habitat in regione montana Armeniae rossicae et in montibus ad Mzchet Transcaucasiae centralis.

A. r. Georg. Asia Minor, Caucasus.

3. **Campanula finitima** Fom., l. c., p. 15, c. tab.

*Crispule canescenti-pubescentis, caulibus e rhizomate sublignoso crasso saepe ramoso tenuibus ascendentibus foliosis flexuosis superne divaricatis breviter et corymbose-ramulosis, ramulis 1-floris, foliis rigidis radicalibus late ovatis basi cordatis vel subcordatis, caulinis inferioribus oblongo-ovatis obtusis basi cuneatis margine serrato-crenatis longe petiolatis, superioribus diminutis breviter petiolatis, summis subsessilibus, pedicellis erectis calyce multo brevioribus bracteolatis, bracteolis lineari-lanceolatis, calycis laciniis late triangularibus acutis corolla pubescente sat magna campanulata alba extus saepe purpurascente ore barbata 3-plo brevioribus, floribus virgineis extus semper purpurascentibus, appendicibus parvis angulatis tubo calyceino multo brevioribus (vidi viva et sicca). Perennis.*

*C. betulaefoliae* C. Koch valde affinis ab ea indumentoca nescente, corolla campanulata nec anguste campanulata, calycis laciniis late triangularibus acutis nec lanceolatis acutissimis, appendicibus parvis angulatis tubo calyceino multo brevioribus, foliis serrato-crenatis nec argute et grosse denticulatis distincta.

Habitat prope Tamrut distr. Olty, prov. Kars ad fines turcicas ubi a cl. E. Königo detecta.

4. **Fritillaria Michailovskyi** Fom., l. c., p. 18.

Nana, caule unifloro a medio foliis 2—3 sparsis obsito, foliis inferioribus oblongo-ellipticis obtusis, superioribus lanceolatis acutiusculis, flore mediocri cernuo campanulato, perigonii phyllis oblongo-ellipticis apice minute ciliatis extus parte inferiori livide vinosis, parte superiori macula rhombea magna lutea utrinque notatis, intus ad basin vinoso-purpureo-tessellatis, nectario ovato profundo extus in gibbum vel fere calcar prominenti, filamentis minute dense papillois anthera sublongioribus, stylo ovarium subaequante ad medium trifido, capsula . . . (vidi viva).

Habitat in regione alpina montis Askjar-dagh prov. Kars ubi a cl. S. J. Michailovskyo detecta.

Planta 2—3-pollīcaris, folia inferiora 4½ cm longa, 1½ cm lata, perigonii phylla ad 2½ cm longa. Affinis *F. aureae* Schott. et *F. Kurdicae* Boiss., sed ab eis specificè distincta. Differt a *F. aurea* floris magnitudine, perigonii coloratione, filamentis papillois; a *F. Kurdica* praeterea nectariis profundis extus in gibbum vel fere calcar prominentibus distincta.